

Medellín, 31 de julio de 2003

Señores
Editores
Acta Médica Colombiana
Bogotá

Síndrome antifosfolípido

Con alegría e interés leímos el editorial del último número de Acta Médica Colombiana en el cual se hace un registro histórico acerca del síndrome antifosfolípido (1).

Es muy interesante que se dé importancia a esta nueva entidad. Llama sí la atención en esta nota histórica la ausencia en el texto y referencias del Dr. Donato Alarcón-Segovia y su grupo del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán, quienes han realizado múltiples aportes a este síndrome.

En una revisión en la base de datos Medline, se puede encontrar más de 60 referencias que dan cuenta de los múltiples aportes de este grupo, los cuales han permitido conocer más profundamente las manifestaciones clínicas (2,3), la fisiopatología (4-7) y adicionalmente permitieron establecer criterios de clasificación para el síndrome antifosfolípido primario (8).

Además, cabe recordar que en la ciudad de Barcelona en la reunión de ILAR en el año 1993 el Dr. Alarcón-Segovia fue reconocido, junto al Dr. G. Hughes, por sus aportes en este síndrome.

Por estas razones nos extraña profundamente que el Dr. Alarcón-Segovia y su grupo sean nombres ausentes en el artículo «20 años del síndrome antifosfolípido: pasado, presente y futuro».

El grupo del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán en la ciudad de México D.F., es un baluarte de la

investigación médica y constituye un norte para los médicos e investigadores latinoamericanos.

Atentamente

Oscar Uribe Uribe
Gloria María Vasquez D.
Luis Alberto Ramírez Gómez
Oscar Felipe de la Cruz
Ruth Erazo
Mónica María Velásquez
Luis Alfonso Gonzalez

Bibliografía

1. Gómez-Puerta JA, Cervera R, Kamashta MA. Veinte años del síndrome antifosfolípido: pasado, presente y futuro. *Acta Med Colomb* 2003; **28**: 61-62.
2. Alarcón-Segovia D, Cabral AR. The anti-phospholipid antibody syndrome: clinical and serological aspects. *Bailliere Best Pract Res Clin Rheumatol*. 2000 Mar; **14**(1): 139-50.
3. Tishler M, Alosachie I, Chapman Y, Korcyn A, Lorber M, Mevorach D, Tañe d, Barka N, Lin HC, Alarcón-Segovia D, et al. Anti-neuronal antibodies in antiphospholipid syndrome with central nervous system involvement: the difference from systemic lupus erythematosus. *Lupus*. 1995; **4**:145-7.
4. Alarcón-Segovia D, Deleze M, Oria CV, Sánchez-Guerrero J, Gómez-Pacheco L, Cabiedes J, Fernández L, Ponce de León S. Antiphospholipid antibodies and the antiphospholipid syndrome in systemic lupus erythematosus. A prospective analysis of 500 consecutive patients. *Medicine (Baltimore)*. 1989; **68**:353-65.
5. Alarcón-Segovia D, Mestanza M, Cabiedes J, Cabral AR. The antiphospholipid/cofactor syndromes II. A variant in patients with systemic lupus erythematosus with antibodies to beta 2-glycoprotein I but no antibodies detectable in standard antiphospholipid assays. *J Rheumatol*. 1997; **24**:1545-51.
6. Cabral AR, Cabiedes J, Alarcón-Segovia D. Antibodies to phospholipid-free beta 2-glycoprotein-I in patients with primary antiphospholipid syndrome. *J Rheumatol*. 1995; **22**:1894-8.
7. Prieto GA, Cabral AR, Zapata-Zuniga M, Simon AAJ, Villa AR, Alarcón-Segovia D, Cabiedes J. Valine/valine genotype at position 247 of the beta2-glycoprotein I gene in Mexican patients with primary antiphospholipid syndrome: association with anti-beta2-glycoprotein I antibodies. *Arthritis Rheum*. 2003; **48**:471-4.
8. Alarcón-Segovia D, Sánchez-Guerrero J. Primary antiphospholipid syndrome. *J Rheumatol*. 1989; **16**:482-8.