

Lesiones de Janeway Un clásico para no olvidar

Janeway lesions A classic to remember

ROQUE JULIO CORZO-CORZO, PAULA ANDREA ESPÍNDOLA-PATÍÑO • BUCARAMANGA (COLOMBIA)

DOI: <https://doi.org/10.36104/amc.2026.4849>



Figura 1. Máculas eritematosas múltiples de 1 cm en región palmar tenar de la mano derecha.



Figura 2a. Pápulas agrupadas hemorrágicas de 2x1 cm en región dorsal lateral del pie derecho.



Figura 2b. Confluencia de pápulas hemorrágicas de 3x2 cm con zona de excoriación en región distal plantar del pie derecho.

Las lesiones de Janeway son máculas o pápulas hemorrágicas indoloras que constituyen una manifestación cutánea clásica de la endocarditis infecciosa, asociadas a fenómenos vasculares, y se reportan en hasta el 5% de los pacientes (1). Presentamos el caso de una mujer de 43 años, con antecedente de procedimiento dental invasivo reciente, que consultó al servicio de urgencias por fiebre prolongada, disnea, poliartralgias y lesiones violáceas indoloras de tipo macular, localizadas en la región tenar de la mano derecha (Figura 1), así como placas hemorrágicas en dos zonas del pie derecho: región dorsolateral (Figura 2a) y región plantar (Figura 2b).

El ecocardiograma transtorácico evidenció una vegetación de 4 mm en la válvula mitral. Los hemocultivos revelaron crecimiento de *Staphylococcus aureus* sensible a oxacilina. Durante la hospitalización, la paciente desarrolló un evento cerebrovascular hemorrágico con deterioro neurológico y edema cerebral secundario, que requirió craniectomía descompresiva, con complicaciones posteriores y desenlace fatal. La presencia de manifestaciones cutáneas en la endocarditis infecciosa se ha asociado con una mayor carga embólica y un peor pronóstico (2).

Referencias

1. Murdoch DR, Corey GR, Hoen B, Miró JM, Fowler VG Jr, Bayer AS, et al. Clinical presentation, etiology, and outcome of infective endocarditis in the 21st century: the International Collaboration on Endocarditis-Prospective Cohort Study: The international collaboration on endocarditis-prospective cohort study. *Arch Intern Med.* 2009;169(5):463–73.
2. Servy A, Valeyrie-Allanore L, Alla F, Lechiche C, Nazeyrollas P, Chidiac C, et al. Prognostic Value of Skin Manifestations of Infective Endocarditis. *JAMA Dermatology.* 2014;150(5):494.

Dr. Roque Julio Corzo-Corzo: Especialista en Medicina Interna. Servicio de Urgencias, Hospital Universitario de Santander (HUS). Docente de Medicina, Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y Universidad Industrial de Santander (UIS); Dra. Paula Andrea Espíndola-Patíño: Médica General. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga (Colombia)

Correspondencia: Paula Andrea Espíndola Patíño. Bucaramanga (Colombia).

E-Mail: paula2191704@correo.uis.edu.

Recibido: 07/IX/2025 Aceptado: 05/XII/2025

